



Rosa tomentosa.

P. A. Redouté pinx.

Rosier Cotonneux.

Supplément de Bernard.

Langlois sculp.

LES ROSES.

39

ROSA TOMENTOSA.

(Voyez ci-après l'espèce n° 3, section B.)

LE ROSIER COTONNEUX.

DESCRIPTION.

Les tiges de ce Rosier s'élèvent à quatre ou cinq pieds : elles sont armées d'aiguillons longs, presque droits, un peu comprimés à leur base. Les folioles, moins grandes que celles du *Villosa vulgaris*, sont couvertes, sur les deux faces, de poils mous, nombreux et couchés; enfin il ne diffère du *Rosier velu* que par les tubes de ses calices et ses fruits d'une forme ovoïde plus ou moins allongée. Ses fleurs sont d'un rose-pâle. Il est commun dans la forêt de Fontainebleau. C'est mademoiselle Joséphine REDOUTÉ qui l'a découvert, en 1817, dans un rayon plus rapproché de Paris, aux bois de Meudon, près de la faisanderie; jusque-là, il avait échappé aux recherches de M. THUILLIER, ou, peut-être, cet habile nomenclateur n'a-t-il vu dans ce Rosier qu'une variété du *R. Villosa*.

Disposition méthodique, en un seul groupe, des Rosiers à feuilles velues sur leurs deux faces.

ROSE VILLOSE.

Rosae germinibus globosis in §. A., ovatis in §. B., pedunculisque glabris, hispides; foliis utrinque marginisque villulis aut tomentosis, duplicato dentatis; caule aculeis subrectis, basi subcompressis. (N.)

§. A.

Tubes globuleux, ou presque globuleux.

* *Pédoncules hispides nœux que les tubes.*

1. *R. Villosa vulgaris* B&L, En. Bot. p. 151. R. (*villosa*) L. Sp. 704. WILLD. Spec. 2, 1069. DC. Fl. franc. édité 3, n° 3700. TREILL. Fl. de Paris, édité 2, p. 251. MÉR. Nouv. Fl. de Paris, p. 196. DÉR. Essai, p. et var. 5. R. (*hispida*) POIR. Ency. 6, p. 285.